

CALENDÁRIO VACINAL SBIm 2019/2020

Do nascimento à terceira idade.



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																				ADOLESCENTE	ADULTO	IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS							
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos				20 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS	NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*		
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase					SIM	SIM	NÃO								
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento								Vacinar os não vacinados anteriormente												SIM	SIM	SIM								
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.								CONTRAINDICADA																				SIM	SIM	NÃO
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)					SIM, DTPw e dT dTpa para gestantes	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa									
Haemophilus influenzae tipo b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses	SIM	SIM, até 19 anos									
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses	SIM	SIM									
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco			VPC13: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10									
Meningocócicas conjugadas	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, menC para menores de 5 anos e adolescentes de 11 a 14 anos	SIM	SIM, menC									
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses. De 24 meses a 19 anos: duas doses					Vacinar pessoas em situações especiais de risco			NÃO	SIM	NÃO								
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																				SIM	NÃO	NÃO								
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																				SIM, menores de 6 anos e maiores de 60 anos	SIM	SIM								
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias, não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal																				SIM	SIM	NÃO								
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco				SIM, até 49 anos	SIM	NÃO								
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente										SIM	SIM	SIM							
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM				
HPV												Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.			Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)		SIM, duas doses. Meninas (9 a 14 anos) e meninos (11 a 14 anos)			SIM	SIM								
Pneumocócica 23 valente												Vacinar pessoas em situações especiais de risco										Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO	SIM	SIM					
Herpes zóster																						De 50 a 59 anos: a critério médico		Uma dose		NÃO	SIM	NÃO			
Dengue	CONTRAINDICADA														Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses					CONTRAINDICADA		NÃO	SIM	NÃO							

21/01/2020 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIm 2019/2020* e nos *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*.

* Consultar manual do CRIE em www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf
Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*.

